

CALENDÁRIO VACINAL ESPECIAL PARA O PREMATURO EXTREMO EM SANTA CATARINA

(RN MENOR DE 1.500G OU 33 SEMANAS DE GESTAÇÃO)
ATUALIZADO EM ABRIL DE 2025.

Grupo alvo	Idade	BCG ⁽¹⁾	Hepatite B	Hexavalente acelular ⁽²⁾ (DTPa+Hib+VIP+HB)	Pneumo 10	Rotavírus ⁽⁴⁾	Meningo C	Febre Amarela	Hepatite A	Tríplice Viral	Tetraviral ⁽⁵⁾	Varicela ⁽⁶⁾
Criança	Ao nascer	Dose única	Dose ao nascer									
	2 meses			1ª dose	1ª dose	1ª dose ⁽⁵⁾						
	3 meses						1ª dose					
	4 meses			2ª dose	2ª dose	2ª dose						
	5 meses						2ª dose					
	6 meses			3ª dose								
	9 meses							1ª dose				
	12 meses				Reforço		Reforço			1ª dose		
	15 meses			1ª reforço					Dose única		Dose única	
4 anos			2ª reforço ⁽³⁾ (DTPa/dTpa)				Reforço					2ª dose

(1) BCG: adiar a vacinação quando o peso for inferior a 2.000 kg. Crianças nascidas de mães que utilizaram imunomoduladores durante os dois últimos trimestres da gestação devem ter a vacina BCG adiada para 6 a 12 meses de vida.

(2) O esquema com a vacina Hexavalente acelular deverá ser realizado aos dois (2), quatro (4) e seis (6) meses e no primeiro reforço. O intervalo mínimo entre a 3ª dose da vacina Hexa acelular e a dose de reforço (dose referente aos 15 meses) deve ser de 6 meses.

(3) Na ausência da vacina DTPa poderá ser realizada a vacina dTpa.

(4) Rotavírus: enquanto permanecer internada, não deve receber. a) Primeira dose (D1) aos dois meses de idade, podendo ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias; b) Segunda dose (D2) aos 4 meses de idade, podendo ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 23 meses e 29 dias.

(5) Tetraviral: em crianças de 15 meses a 4 anos, que já tenham feito uma dose de Tríplice Viral, com intervalo mínimo de 30 dias.

(6) Varicela: segunda dose da vacina varicela para crianças de 4 até 6 anos de idade. A primeira dose é administrada aos 15 meses de idade com a vacina tetra viral.

CALENDÁRIO SUJEITO ATUALIZAÇÃO.