




ESQUEMAS VACINAS BIVALENTES · COVID-19

PRÉ-REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DA DOSE DE REFORÇO COM AS VACINAS BIVALENTES:

- Apresentar pelo menos o esquema primário completo de duas doses de vacinas monovalentes;
- Respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose do esquema primário ou última dose de reforço com as vacinas monovalentes.



PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS - IMUNOCOMPETENTE

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE
Pfizer, AstraZeneca e Janssen	1º dose (D1) e 2º dose (D2)	8 semanas após D1	Intervalo mínimo de 4 meses após o reforço monovalente ou última dose do esquema primário (básico).
CoronaVac	1º dose (D1) e 2º dose (D2)	4 semanas após D1	Imunizante: COVID-19 Pfizer bivalente

PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS - IMUNOSSUPRIMIDO

VACINA	ESQUEMA PRIMÁRIO	INTERVALO	REFORÇO BIVALENTE
Pfizer, AstraZeneca e Janssen	1º dose (D1), 2º dose (D2) e 3º dose (D3).	D2: 8 semanas após a (D1) D3: 8 semanas após a (D2)	Intervalo mínimo de 4 meses após o reforço monovalente ou última dose do esquema primário (básico).
CoronaVac	1º dose (D1), 2º dose (D2) e 3º dose (D3).	D2: 4 semanas após a (D1) D3: 4 semanas após a (D2)	Imunizante: COVID-19 Pfizer bivalente