

# DIFERENTES FORMULAÇÕES DA VACINA PFIZER



<b>FORMULAÇÃO</b>	<b>6 MESES A 4 ANOS</b> (ou seja, 6 meses a menores de 5 anos de idade). DILUIR PARA USO	<b>6 MESES A 4 ANOS</b> (ou seja, 6 meses a menores de 5 anos de idade). DILUIR PARA USO	<b>5 A 11 ANOS</b> (ou seja, 5 anos a menores de 12 anos de idade). NÃO DILUIR	<b>12 ANOS OU MAIS</b> NÃO DILUIR
Frasco	Frasco multidose	Frasco multidose	Frasco multidose	Frasco multidose
Cor da tampa do frasco	TAMPA AMARELA 	TAMPA VINHO 	TAMPA AZUL 	TAMPA CINZA 
Dosagem	3 mcg	3 mcg	10 mcg	30 mcg
Doses por frasco	03 doses por frasco (após diluição)	10 doses por frasco (após a diluição)	6 doses por frasco	6 doses por frasco
Diluição	Diluição necessária	Diluição necessária	NÃO DILUIR	NÃO DILUIR
Quantidade de diluente necessário por frasco	1,1 ml	2,2 ml	NÃO DILUIR	NÃO DILUIR
Volume de aplicação por dose (pós-diluição)	0,3 ml	0,2 ml	0,3 ml	0,3 ml
Tempo de armazenamento em freezer de Ultra Baixa temperatura -ULTF (de -90°C a -60°C)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)	18 meses (prazo de validade)
Tempo de armazenamento em freezer (de -25°C a -15°C)	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR	NÃO ARMAZENAR
Tempo de armazenamento em refrigerador (de 2°C a 8°C)	10 semanas	10 semanas	10 semanas	10 semanas
Após a primeira aplicação ou diluição (de 2°C a 8°C)	Descartar 12 horas após a diluição	Descartar 12 horas após a diluição	Descartar 12 horas após a primeira aplicação	Descartar 12 horas após a primeira aplicação