Orientações do Ministério da Saúde para utilização de Equipamentos de Proteção Individual em Serviço de Referência Estadual

Paciente com gravidade

Com vômito, diarreia ou sangramento ativo

e Transporte

Todos os profissionais envolvidos na assistência direta ou indireta a pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus Ebola devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de acordo com a situação ou atividade de risco profissional.

ORIENTA-SE

- ✓ Certificar-se com antecedência do tamanho adequado dos EPI para seu uso.
- ✓ Lavar as mãos com água e sabonete antes e após procedimentos.
- ✓ Prender os cabelos firmemente, evitando a exposição dos mesmos e possíveis contaminações.
- ✓ Antes da colocação dos EPI, o profissional deve checar seus bolsos, certificando-se de que não há celulares, documentos, entre outros. Retirar também todos os adornos, como brincos, pulseiras, anéis, etc.
- ✓ Fixar roteiro de colocação dos EPI antes da entrada do quarto de isolamento ou na antecâmara.
- ✓ Fixar roteiro de retirada do EPI dentro do quarto de isolamento ou no local de retirada.
- ✓ Utilizar um espelho, que possibilite a visualização total do profissional paramentado e desparamentado, no local de colocação e retirada dos EPI para orientá-lo, evitando possíveis erros.
- ✓ Definir um supervisor para narrar o passo-a-passo da colocação e retirada dos EPI e SEMPRE trabalhar em dupla.
- ✓ Utilizar fitas adesivas, fixadas no chão, para sinalização de segurança e risco (vermelha, amarela ou verde) dentro do quarto de isolamento.
- ✓ Após a retirada dos EPI, o profissional de saúde deve tomar um banho corporal completo.

EPI para atendimento de paciente grave e para profissionais que realizarão o Transporte

Protetor facial

Macacão

Máscara PFF2 ou N95

Capote

1 par de luvas cirúrgicas e 1 de luvas nitrílicas

OU

2 pares de luvas cirúrgicas

Botas de cano longo

2 pares de cobre botas

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

1

Roupa privativa da instituição (hospital/SAMU) e botas

2

Cobre botas (sobre botas)

O primeiro cobre botas deve estar por dentro do macacão e o segundo por fora

3

Gorro

O gorro é indicado para ajudar a manter os cabelos presos.

4

Máscara de proteção respiratória (PFF2 ou N95)

Realizar o teste de vedação da máscara

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

5

Capote

E

Macacão

Capote impermeável longo (devendo ultrapassar parcialmente o cobre botas)

Macacão impermeável em tecido não tecido, com costuras termoseladas, capuz, mangas compridas, punhos e tornozelos com elásticos, fechamento frontal por zíper até a região do queixo e pala de proteção sobre o zíper

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

6

Luvas Cirúrgicas

Luvas Nitrílicas

Um par de luvas cirúrgicas + um par de luvas nitrílicas sobre as cirúrgicas
OU
Dois pares de luvas cirúrgicas

7

Protetor Facial

Ordem de paramentação

1

Colocar a roupa privativa e as botas

2

Colocar o 1º cobre botas cobrindo totalmente a bota

3

Colocar o gorro
Colocar máscara PFF2 ou N95
Fazer teste de vedação

Ordem de paramentação

4

Colocar o **macacão**

5

Colocar o **2º cobre botas**

Ordem de paramentação

6

Colocar o capote
Colocar o protetor facial

7

Colocar 1º par de luvas cirúrgicas por dentro do capote

Colocar o 2º par de luvas (podendo ser nitrílicas ou cirúrgicas) por fora do capote

Ordem de desparamentação

O local de desparamentação deverá dispor de luvas de procedimento para troca, preparação alcoólica para as mãos a 70%, além de dispensador para preparação alcoólica com acionamento automático

1

2

Retirar o par de luvas externo
Higienizar as mãos enluvadas com preparação alcoólica a 70% (par interno)
Calçar novo par de luvas

Retirar o protetor facial curvando-se para frente
Obs.: todos os EPI deverão ser descartados como resíduos do Grupo A1, conforme descrito na RDC/Anvisa nº 306 de 04 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Ordem de desparamentação

3

Retirar o capote

4

Retirar o cobre botas
Retirar as luvas externas
Higienizar as mãos enluvadas
com preparação alcóolica para as mãos a 70% (par interno)

Ordem de desparamentação

5

Calçar novo par de luvas de procedimento
Retirar o capuz
Retirar o macacão, **juntamente com o par de luvas externo**. Para retirada do macacão, segure por fora e enrole-o de dentro para fora.

6

Higienizar as mãos enluvadas a preparação alcóolica a 70% (par interno)
Calçar novo par de luvas
R**etirar a máscara** curvando-se para frente
Retirar o gorro

Ordem de desparamentação

7

Retirar o cobre botas, passando da área vermelha (mais contaminada) **para a área amarela** (menos contaminada)

8

Retirar os dois pares de luvas (externo e interno)

Higienizar as mãos com preparação alcoólica 70% ou água e sabonete;

Sair do quarto, **calçar novo par de luvas de procedimento**

Retirar as botas

Retirar as luvas e

Higienizar as mãos

Para maiores informações, leia o Plano de Contingência para Emergência – Doença pelo Vírus Ebola disponível em:

www.saude.gov.br/svs