

Orientações do Ministério da Saúde para utilização de Equipamentos de Proteção Individual em Serviço de Referência Estadual

Paciente sem gravidade

Sem vômito, diarreia ou sangramento ativo

Todos os profissionais envolvidos na assistência direta ou indireta a pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus Ebola devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de acordo com a situação ou atividade de risco profissional.

ORIENTA-SE

- ✓ **Certificar-se com antecedência do tamanho adequado dos EPI para seu uso.**
- ✓ **Lavar as mãos com água e sabonete antes e após procedimentos.**
- ✓ **Prender os cabelos firmemente, evitando a exposição dos mesmos e possíveis contaminações.**
- ✓ **Antes da colocação dos EPI, o profissional deve checar seus bolsos, certificando-se de que não há celulares, documentos, entre outros. Retirar também todos os adornos, como brincos, pulseiras, anéis, etc.**
- ✓ **Fixar roteiro de colocação dos EPI antes da entrada do quarto de isolamento ou na antecâmara.**
- ✓ **Fixar roteiro de retirada do EPI dentro do quarto de isolamento ou no local de retirada.**
- ✓ **Utilizar um espelho, que possibilite a visualização total do profissional paramentado e desparamentado, no local de colocação e retirada dos EPI para orientá-lo, evitando possíveis erros.**
- ✓ **Definir um supervisor para narrar o passo-a-passo da colocação e retirada dos EPI e SEMPRE trabalhar em dupla.**
- ✓ **Utilizar fitas adesivas, fixadas no chão, para sinalização de segurança e risco (vermelha, amarela ou verde) dentro do quarto de isolamento.**
- ✓ **Após a retirada dos EPI, o profissional de saúde deve tomar um banho corporal completo.**

Para atendimento de paciente não grave: com CAPOTE ou com MACACÃO



Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

1



**Roupa privativa da instituição
e botas**

2



Cobre botas (sobre botas)

3



Gorro

O gorro é indicado para ajudar a manter os cabelos presos.

4



**Máscara de proteção respiratória
(PFF2 ou N95)**

Realizar o teste de vedação da máscara

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

5



Capote

OU

Macacão



Capote impermeável longo (devendo ultrapassar parcialmente o cobre botas)

Macacão impermeável em tecido não tecido, com costuras termoseladas, capuz, mangas compridas, punhos e tornozelos com elásticos, fechamento frontal por zíper até a região do queixo e pala de proteção sobre o zíper

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados

6



Luvas Cirúrgicas



Luvas Nitrílicas

**Um par de luvas cirúrgicas + um par de luvas nitrílicas sobre as cirúrgicas
OU
Dois pares de luvas cirúrgicas**

7



Protetor Facial

Ordem de **paramentação** com utilização do Capote



1

Colocar a **roupa privativa** e as **botas**



2

Colocar o **cobre botas** cobrindo totalmente a bota



3

Colocar o **capote**

Ordem de paramentação com utilização do Capote



- 4** Colocar o **gorro**
Colocar a **máscara PFF2 ou N95** e
fazer teste de vedação



- 5** Colocar o **protetor facial**

Ordem de paramentação com utilização do Capote



6

Colocar o **primeiro par de luvas cirúrgicas**, por dentro do capote



7

O **segundo par** (poderá ser de **luvas nitrílicas ou cirúrgicas**) por fora do punho do capote

Ordem de **desparamentação** com utilização do Capote

O local de desparamentação deverá dispor de luvas de procedimento para troca, preparação alcoólica para as mãos a 70%, além de dispensador para preparação alcoólica com acionamento automático

1



Retirar o **par de luvas externo**
Higienizar as mãos enluvadas
com preparação alcoólica para as
mãos a 70% (par interno)
Calçar **novo par de luvas de
procedimento**

2



Retirar o **protetor facial** curvando-se para
frente

Obs.: O protetor deve ser descartado.

Ordem de desparamentação com utilização do Capote

3



Retirar o **capote** juntamente com as **luvas externas**

Higienizar as mãos enluvadas (par de luvas interno) com preparação alcoólica para as mãos a 70%.

4



Calçar **novo par de luvas** de procedimento
Retirar a **máscara** **curvando-se para a frente**

5



Retirar o **gorro**

Ordem de desparamentação com utilização do Capote

6



Retirar o **cobre botas**,
passando da área **vermelha**
(mais contaminada) para a
área **amarela** (menos
contaminada)

7



Retirar os **dois pares de luvas** (externo e interno);

Higienizar as mãos com preparação alcoólica 70% ou água e sabonete;

Sair do quarto, **calçar novo par de luvas de procedimento**

Retirar as **botas**;

Retirar as **luvas** e

Higienizar as mãos

Ordem de **paramentação** com utilização do Macacão

1



Colocar a **roupa**
privativa e as
botas

2



Colocar o **cobre**
botas cobrindo
totalmente a bota

3



Colocar o **gorro**
Colocar **máscara** PFF2 ou N95;
Fazer teste de vedação

Ordem de paramentação com utilização do Macacão

4



Colocar o **macacão**

5



Colocar o **protetor facial**

Ordem de paramentação com utilização do Macacão

6



Colocar o **primeiro par de luvas cirúrgicas**, por dentro do macacão

7



o **segundo par de luvas** (poderá ser de **nitrílicas** ou **cirúrgicas**) por fora do punho do macacão

Ordem de **desparamentação** com utilização do Macacão

O local de desparamentação deverá dispor de luvas de procedimento para troca, preparação alcoólica para as mãos a 70%, além de dispensador para preparação alcoólica com acionamento automático

1



Retirar o par de luvas externo
Higienizar as mãos enluvadas
com preparação alcoólica a 70%
(par interno)
Calçar novo par de luvas de
procedimento

2



Retirar o protetor facial curvando-se para frente

Obs.: todos os EPI deverão ser descartados como resíduos do Grupo A1, conforme descrito na RDC/Anvisa nº 306 de 04 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

Ordem de desparamentação com utilização do Macacão

3



Retirar o **capuz**, enrolando-o até a região cervical

Higienizar as mãos enluvadas com preparação alcoólica a 70% (par interno)

Calçar **novo par de luvas de procedimento**

4



Segurar, com as duas mãos o macacão na altura do ombro e jogar para trás


Realizar movimento de rotação dos ombros para retirar as mangas do macacão

Quando o macacão estiver na altura da cintura, iniciar movimento de marcha com os pés, para retirar por completo o **macacão**

Descartar em local apropriado

Ordem de desparamentação com utilização do Macacão

5



Higienizar as mãos enluvadas com preparação alcoólica a 70% (par interno)
Calçar **novo par de luvas**,
Retirar a **máscara**, curvando-se para frente
Retirar o **gorro**

Ordem de desparamentação com utilização do Macacão

6



Retirar o **cobre botas**, passando da área vermelha (mais contaminada) para a área amarela (menos contaminada)

7



Retirar os **dois pares de luvas** (externo e interno)

Higienizar as mãos com preparação alcoólica 70% ou água e sabonete

Sair do quarto, **calçar novo par de luvas de procedimento**

Retirar as **botas**

Retirar as **luvas** e

Higienizar as mãos

Para maiores informações, leia o Plano de Contingência para Emergência – Doença pelo Vírus Ebola disponível em:

www.saude.gov.br/svs



O Ministério ▸ Secretarias ▸ SVS

Detalhes

Criado: 08 Julho 2013

SVS | SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SVS institucional
Quem é quem
Vigilância de A a Z
Publicações
Agenda do Secretário
EAD – Inscrições abertas
Editais e Chamamentos
Lista Nacional de Notificação Compulsória – Formulários
Portarias – Esclarecimentos
Notificação de Violência Interpessoal / Autoprovocada



Tratamento como prevenção apresenta primeiros resultados na epidemia da aids

Campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo será estendida até 12 de dezembro

Ministério atualiza situação do vírus Chikungunya

SUS passa a vacinar gestantes contra coqueluche

Cresce número de mortes por câncer do colo do útero no Brasil

Vírus Ebola
Informações e atualizações

GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Chikungunya

Tire suas dúvidas

14ª EXPOEPI

Confira a exposição aqui!

