

01 O QUE É HANTAVIROSE?

É uma doença transmitida pela aspiração da poeira e aerossóis contaminados com a urina, fezes ou saliva de ratos silvestres ou até mesmo pela mordida desses roedores. A hantavirose é muito grave e pode levar à morte em apenas 72 horas se não tratada.

02 QUAIS OS SINTOMAS?

Os sinais e sintomas podem aparecer até 60 dias após a pessoa se expor ao local contaminado. No início, parece uma gripe forte. Com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, em alguns casos acontece diarreia, enjoo e vômitos. Tosse seca e falta de ar são sinais de agravamento da doença.

03 QUEM TEM MAIOR RISCO DE ADOECER?

Agricultores, trabalhadores de áreas de reflorestamento, pessoas que vivem ou trabalham no campo e que fazem atividades em locais fechados como paióis, armazéns, galpões, casas de campo, despensas, porões, sótãos e outros estão mais expostos ao vírus. Também pescadores, ecoturistas e pesquisadores científicos estão sujeitos a hantavirose.

O QUE FAZER?

Ao perceber algum sinal ou sintoma, não espere! Procure uma unidade de saúde. Lembre-se de dizer como é o local onde você mora e trabalha, principalmente se for em área rural e se há roedores silvestres.

! LEMBRE-SE! A HANTAVIROSE MATA!

Preservar o meio ambiente e os animais que se alimentam de ratos silvestres (cobras, gaviões, corujas, cachorros e gatos do mato) é a forma natural de controlar a transmissão da hantavirose.

ONDE ENCONTRAR
MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE A HANTAVIROSE?

Na Secretaria de Saúde do seu município e também no site

WWW.DIVE.SC.GOV.BR



HANTA VIROSE

! SAIBA COMO
EVITAR A DOENÇA
TRANSMITIDA
POR ROEDORES
SILVESTRES



COMO EVITAR A DOENÇA

Nunca descansar em locais fechados com restos de alimentos ou grãos.



Armazenar insumos suspensos em estrados, em depósito/paiol afastados de casas, lavouras e mata.

Dentro de casa, coloque toda a comida em sacos ou caixas fechadas numa altura de pelo menos 40 cm do piso.



Mantem a vegetação rasteira em um raio de pelo menos 40m ao redor das construções, evitando abrigo e proteção ao roedor.

Ambientes que permanecem fechados por algum tempo e que apresentem sinais da presença de roedores devem ser abertos e ventilados por, no mínimo 30 minutos.



Fechar aberturas e fendas com mais de 0,5cm para evitar acesso de roedores em casas e anexos.

Mantenha a área em volta de casas, galpões e alojamentos sempre limpa, sem mato, pneus velhos ou entulhos.

Mantenha limpo o local onde vivem os animais, recolhendo sempre a sobra de comida.



Se não houver coleta regular, enterrar o lixo orgânico, a no mínimo 30 metros das construções.

O plantio de capim e outros grãos deve ser feito a no mínimo 40m de distância da residência.



Se possível, evite contato direto com roedores ou com suas fezes e urina.



Coloque as pilhas de lenha em estrados suspensos do chão.



Ao ventilar e limpar os ambientes fechados, use máscara respiratória com filtro P3.

