

Resumo Nova conduta de uso de IGHAR e SAR



LIMITES MÁXIMOS

SAR = 3000 UI (3 ampolas)
IGHAR = 1500 UI (5 ampolas)

De acordo com o peso.

ANIMAIS SILVESTRES E MORCEGOS

Infiltrar o máximo possível do SAR
ou da IGHAR no local da lesão e o
restante da dose IM.

ACIDENTES GRAVES CÃES E GATOS NÃO OBSERVÁVEIS

Infiltração somente no local da lesão, sem
necessidade de aplicar o restante em
local distante até a dose máxima.

ACIDENTES GRAVES - ANIMAIS DE PRODUÇÃO (BOVINOS, SUÍNOS, EQUINOS, ETC).

Infiltração somente no local da lesão, sem
necessidade de aplicar o restante em
local distante até a dose máxima.

EXEMPLO:

PACIENTE = 100 Kg >>>> receberá 3.000 UI de SAR = 15 ml = **três ampolas**.

Analisar criteriosamente o ferimento, irá abrir 1 ampola de SAR e infiltrar no ferimento, se o volume da primeira ampola for insuficiente para infiltrar toda a região anatômica, abrir a segunda ampola, e assim sucessivamente.

Não é recomendada a abertura de uma ampola apenas para aplicação do restante da dose calculada por via intramuscular (IM).

! LEMBRANDO:

Somente um médico veterinário pode determinar se um animal é suspeito ou não de raiva no momento da agressão.

