

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO

PACIENTE VÍTIMA DE MORDEDURA DE ANIMAL MAMÍFERO

Conduta conforme animal agressor

Cães ou gatos
sem sinais
sugestivos de raiva

Possível observar
o animal?

Sim

Não

Avaliar o animal
durante 10 dias

Mantém-se
saudável

Desapareceu
ou tornou-se
raivoso

Encerrar
o caso

Leve

Grave

Iniciar
vacina

Iniciar
esquema
com soro e
vacina

Cães e gatos
cl clinicamente suspeitos

Avaliar acidente

Leve

Grave

- Iniciar esquema com vacina
- Observar o animal por 10 dias
- Se permanecer vivo interromper o esquema

- Iniciar o esquema com soro e vacina
- Observar o animal por 10 dias
- Se permanecer vivo interromper o esquema

Animais de produção
(boi, cavalo, porco)

Avaliar acidente

Leve

Grave

Aplicar 4
doses de
vacina

Iniciar
esquema
com soro
e vacina

**Morcegos
e Animais
silvestres**

Iniciar imediatamente
o esquema com soro
e vacina

Outros mamíferos urbanos
(rato, camundongo, coelho,
porquinho-da-Índia)

Não é necessária
profilaxia

Observação : Somente um médico veterinário pode avaliar se o animal é suspeito de raiva.

