





















Resumo - Nota Técnica N° 007/2025


GEZOO/DIVE/SUV/SES/SC


Para todos tipos de exposição, a primeira medida é lavar o local exaustivamente e abundantemente com água e sabão.


[Clique aqui](#) para acessar a nota.

		CONTATO INDIRETO	LEVE	GRAVE	ADMINISTRAÇÃO/ SORO-IGHAR
ANIMAL	 Passível de observação por 10 dias e sem sinais sugestivos de raiva				-
	 Não passível de observação, ou se no período de observação o animal morrer, desaparecer ou apresentar sinais sugestivos raiva				GRAVE: APENAS NO LOCAL FERIMENTO
	 MAMÍFEROS DOMÉSTICOS DE INTERESSE ECONÔMICO				APENAS NO LOCAL FERIMENTO
	 ANIMAIS SILVESTRES				INTRALESIONAL + IM
	 MORCEGOS				INTRALESIONAL + IM

LEGENDA:

 Não indicado para profilaxia

 Vacina

 Soro ou imunoglobulina

CONTATO INDIRETO: Contato em pele sem lesões.

LEVE: Lamedura de lesões superficiais ou ferimento superficial em troncos e membros, exceto mãos e pés.

GRAVE: Ferimentos mucosas, cabeça, mãos ou pés; profundo, múltiplos ou extensos em qualquer parte do corpo. Lamedura de lesões profundas ou mucosas.

