

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS SOBREAVISO

(Atualizada em 24/03/2026)



MEDICAMENTOS						
PROGRAMA	PRINCÍPIO ATIVO	CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	APRESENTAÇÃO	VIA DE ADMINISTRAÇÃO	DISPONÍVEL EM:
Coqueluche	CLARITROMICINA - *Novo!	500 MG	Comprimido		Oral	Regionais de Saúde**, Almoarifado SES. **Rio do Sul, Tubarão, Araranguá e Mafra.
Covid-19	NIRMATRELVIR + RITONAVIR	150 MG + 100 MG	Comprimido	Frasco com 30 cp revestidos (20 cp de nirmatrelvir e 10 cp de ritonavir)	Oral	Regionais de Saúde, Almoarifado SES e Municípios prioritários (caráter populacional)
Doença de Chagas	BENZNIDAZOL (pediátrico)	12,5 MG	Comprimido	Blisters com 10 cp	Oral	Almoarifado da SES
	BENZNIDAZOL (adulto)	100 MG	Comprimido	Blisters com 10 cp	Oral	
	NIFURTIMOX	120 MG	Comprimido		Oral	
IST/Aids	ACICLOVIR	250 MG	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intravenosa	Almoarifado da SES
	AZITROMICINA	500 MG	Comprimido	A depender do fornecedor	Oral	
	BENZILPENICILINA BENZATINA	1.200.000 UI	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intramuscular	
	BENZILPENICILINA POTÁSSICA	5.000.000 UI	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intravenosa	
	CEFTRIAXONA	1G	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intramuscular	
	DOLUTEGRAVIR - *Novo!	5 MG	Comprimido dispersível para suspensão oral	Frasco com 60 cp	Oral	
	DOLUTEGRAVIR	50 MG	Comprimido	Frasco com 30 cp	Oral	
	GANCICLOVIR	500 MG	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intravenosa	
	LAMIVUDINA	10 MG/ML	Suspensão oral	Frasco com 240 mL	Oral	
	LOPINAVIR + RITONAVIR	80 MG/20 ML	Solução oral	Frasco com 180 mL	Oral	
	NEVIRAPINA	10 MG/ML	Suspensão oral	Frasco com 100 mL	Oral	
	RALTEGRAVIR	100 MG	Granulado para suspensão oral	Sachê	Oral	
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	80 MG/ML + 16 MG/ML	Solução injetável	Ampola	Intravenosa	
	TENOFOVIR + LAMIVUDINA (2X1)	300 MG + 300 MG (2X1)/cp	Comprimido	Frasco com 30 cp	Oral	
	ZIDOVUDINA	10 MG/ML	Solução oral	Frasco com 240 mL	Oral	
ZIDOVUDINA	10 MG/ML	Solução injetável	Frasco ampola com 20 mL	Intravenosa		
Leishmaniose	ANFOTERICINA B DESOXICOLATO	50 MG	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intravenosa	Almoarifado da SES
	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL	50 MG	Pó liofilizado	Frasco ampola	Intravenosa	
	ANTIMONIATO DE MEGGLUMINA	300 MG/ML	Solução injetável	Ampola com 5 mL	Intravenosa ou Intramuscular	
Malária	ARTEMETER + LUMEFANTRINA (≥15 anos)	20 MG + 120 MG	Comprimido	Blisters com 24 cp	Oral	Regionais de Saúde
	ARTEMETER + LUMEFANTRINA (3 a 8 anos)	20 MG + 120 MG	Comprimido	Blisters com 12 cp	Oral	
	ARTEMETER + LUMEFANTRINA (6 meses a 2 anos)	20 MG + 120 MG	Comprimido	Blisters com 6 cp	Oral	
	ARTEMETER + LUMEFANTRINA (9 a 14 anos)	20 MG + 120 MG	Comprimido	Blisters com 18 cp	Oral	
	ARTESUNATO	60 MG/ML	Solução injetável	1 caixa com 1 ampola	Intravenosa	
	ARTESUNATO + MEFLOQUINA (6 a 11 meses)	25 MG + 50 MG	Comprimido	Blisters com 3 cp	Oral	
	ARTESUNATO + MEFLOQUINA (1 a 5 anos)	25 MG + 50 MG	Comprimido	Blisters com 6 cp	Oral	
	ARTESUNATO + MEFLOQUINA (6 a 11 anos)	100 MG + 200 MG	Comprimido	Blisters com 3 cp	Oral	
	ARTESUNATO + MEFLOQUINA (> 12 anos)	100 MG + 200 MG	Comprimido	Blisters com 6 cp	Oral	
	CLOROQUINA	150 MG	Comprimido	Cartela com 10cp	Oral	
	PRIMAQUINA	15 MG	Comprimido	Cartela com 10cp	Oral	
	PRIMAQUINA (pediátrico)	5 MG	Comprimido	Cartela com 10cp	Oral	
TAFENOQUINA - *Novo!	150 MG	Comprimido	Caixa com 2 cp (150 mg cada)	Oral		
Meningite	RIFAMPICINA	20 MG/ML	Suspensão oral	Frasco com 120 mL	Oral	Regionais de Saúde, Almoarifado da SES
	RIFAMPICINA	300 MG	Cápsula		Oral	

Legenda: CP - Comprimido; DIAF - Diretoria de Assistência Farmacêutica; SES - Secretaria de Estado da Saúde.

MEDICAMENTOS EXCLUÍDOS APÓS A REVISÃO

IST/Aids	LOPINAIVIR 100 MG + RITONAIVIR 25 MG (baby dose) - Comprimido
	RALTEGRAVIR 400 MG - Comprimido
Malária	ARTEMETER 80 MG/ML - Solução injetável
Meningite	RIFAMPICINA 20 MG/ML - Suspensão oral - Frasco com 50 mL

ATENÇÃO!

NIRMATRELVIR + RITONAIVIR

Conforme a [Nota Técnica nº 08/2024 DIAF/SAS/SES/SC](#), os estoques estratégicos presentes nas Regionais de Saúde podem atender os municípios prioritários (caráter populacional) listados no referido documento. Assim, também há um estoque estratégico nestes municípios.

Obs*: O atendimento em regime de sobreaviso, ocorrerá em caráter exclusivo e excepcionalmente, aos casos com prazo final para o início do tratamento (5º dia de sintomas).

IMUNOBIOLOGICOS

PROGRAMA	IMUNOBIOLOGICO	FORMA DE ADMINISTRAÇÃO	CÁLCULO DA DOSE	OBSERVAÇÃO	DISPONIBILIDADE
Acidente por animais peçonhentos	SORO ANTIBOTROPICO (PENTAVALENTE)	Intravenosa	3 Amp. leve; 6 Amp. intermediário; 12 Amp . grave	Diante de atendimento por acidente com animal peçonhento, é indispensável realizar contato com o CIATOX (0800-643-5252) para avaliação da gravidade do caso e orientação quanto à conduta adequada, incluindo a indicação e dispensação de soros antiveneno.	Rede de Frio Central, Regional de Saúde
	SORO ANTICROTALICO		5 Amp. leve, 10 Amp. intermediário, 20 Amp. grave		
	SORO ANTIELAPÍDICO		5 Amp. leve e intermediário e 10 Amp. grave		
	SORO ANTIARACNIDICO* <i>*Ioxosceles, phoneutria e tityus</i>		3 amp. intermediário e 6 amp. grave		
	SORO ANTIESCORPIONICO		3 amp. intermediário e 6 amp. grave		
	SORO ANTILOMOMICO		5 amp. intermediário e 10 amp. grave		
Raiva	SORO ANTIRRABICO HUMANO	Intralesional, Intramuscular	40 UI/kg de peso do paciente, o total administrado no máximo 3000 UI.		
	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTIRRABICA	Intralesional, Intramuscular	Dose de 20UI/Kg de peso do paciente, dose máxima 1500 UI		
	VACINA ANTIRRÁBICA HUMANA	Intramuscular	0,5mL ou 1,0 mL (dependendo do laboratório produtor). Administrar todo o volume do frasco. Doses nos dias 0, 3, 7 e 14 do acidente.	Nota técnica conjunta nº007/2025 - GEDIM/GEZOO/DIVE/SUV/SES/SC	Rede de Frio Central, Regional de Saúde
Botulismo	SORO ANTIBOTULÍNICO AB	Intravenosa	A dose de SAB é diluída em solução fisiológica a 0,9%, na proporção de 1:10 para infundir em aproximadamente uma hora.		Rede de Frio Central, Regional de Saúde* *Rio do Sul e Chapecó
Difteria	SORO ANTIDIFTÉRICO	Intravenosa	<p style="text-align: center;">FORMA LEVE (nasal, cutânea, amigdaliana): 40.000 UI (4 frascos-ampola)</p> <p style="text-align: center;">FORMA MODERADA (laringoamigdaliana ou mista): 60.000 a 80.000 UI (6 a 8 frascos-ampola)</p> <p style="text-align: center;">FORMA GRAVE OU TARDIA (4 dias de doença): 80.000 a 100.000 UI (8 a 10 frascosampola)</p>		Rede de Frio Central
Hepatite B	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B	Intramuscular	Dose única de 0,06mL/Kg (dose máxima de 5mL) ou 0,5mL para recém nascidos.	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição de Risco (PEP) à Infecção por HIV, ISTs e Hepatites Virais	Rede de Frio Central, Regional de Saúde
Tétano	IMUNOGLOBULINA ANTITETANICA	Intramuscular	A dose é de 250 UI, tanto para adultos quanto para crianças, como profilaxia.		Rede de Frio Central, Regional de Saúde
	SORO ANTITETÂNICO	Intravenosa, Intramuscular	A dose profilática é de 5.000 UI, enquanto a dose terapêutica de 20.000 UI.		Rede de Frio Central, Regional de Saúde
Varicela	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-VARICELA ZOSTER	Intramuscular	125 UI para cada 10 kg de peso corporal, dose mínima de 125 UI e máxima de 625 UI.		Rede de Frio Central, Regional de Saúde