

# ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DE INSETICIDAS ADULTICIDAS

ESTRATÉGIA	QUANDO/ONDE UTILIZAR	EQUIPAMENTO UTILIZADO	INSUMO	PERIODICIDADE/ PRAZO PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
 <p><b>Perifocal</b> <a href="#">NT 11/2025/GEZOO/DIVE/SUV/SES</a> <a href="#">NT 05/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS</a></p>	<p>Reincidência de focos de <i>Aedes aegypti</i> em Pontos Estratégicos.</p>	<p>Pulverizador Costal Motorizado Bomba Manual</p>	<p><b>Inseticida residual:</b> Fludora Fusion</p>	<p>Bimestral</p>
 <p><b>Perifocal Preventivo</b></p>	<p>Aplicar em Pontos Estratégicos com potencial risco de proliferação do <i>Aedes aegypti</i> em áreas infestadas.</p>	<p>Pulverizador Costal Motorizado Bomba Manual</p>	<p><b>Inseticida residual:</b> Fludora Fusion</p>	<p>Bimestral</p>
 <p><b>Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI)</b> <a href="#">NT 15/2025/GEZOO/DIVE/SUV/SES</a></p>	<p>Aplicar em imóveis de grande circulação de pessoas em localidades com registro de focos de <i>Aedes spp.</i></p>	<p>Pulverizador a bateria Bomba Manual</p>	<p><b>Inseticida residual:</b> Fludora Fusion</p>	<p>A cada 4 meses</p>
 <p><b>Peridomiciliar</b> <a href="#">NT 02/2024/GEZOO/DIVE/SUV/SES</a></p>	<p>Bloqueio de transmissão com aplicação no peridomicílio dos primeiros casos confirmados de arboviroses.</p>	<p>Pulverizador Costal Motorizado para aplicação à Ultra Baixo Volume</p>	<p><b>Adulticida:</b> Cielo</p>	<p>Em até 10 dias do início dos sintomas, podendo se estender até o 14º dia.</p>
 <p><b>UBV costal</b> <a href="#">NT 1/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS</a></p>	<p>Bloqueio de transmissão nos casos confirmados de arboviroses.  Ou no surgimento de casos suspeitos na mesma área de casos confirmados.</p>	<p>Pulverizador Costal Motorizado para aplicação à Ultra Baixo Volume</p>	<p><b>Adulticida:</b> Cielo</p>	<p>Em até 14 dias do início de sintomas. Pode ser realizada entre 3 a 5 repetições, no intervalo de 3 a 5 dias.</p>
 <p><b>UBV com equipamento pesado veicular</b> <a href="#">NT 1/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS</a></p>	<p>Bloqueio de transmissão quando a capacidade técnica de utilização de UBV costal for ultrapassada.</p>	<p>Pulverizador para aplicação à Ultra Baixo Volume para veículo</p>	<p><b>Adulticida:</b> Cielo</p>	<p>Em até 14 dias do início de sintomas. Pode ser realizada entre 3 a 5 repetições, no intervalo de 3 a 5 dias.</p>



**Obs.:** Utilizar equipamento de proteção individual para cada uma das atividades de acordo com o recomendado nas notas técnicas.