

# FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CASO SUSPEITO DE LEPTOSPIROSE




## DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

**SÍNDROME FEBRIL AGUDA:** indivíduo com febre, cefaleia e mialgia, associada a pelo menos um dos seguintes critérios:

**Critério 1** - Exposição a situações de risco nos 30 dias anteriores à data de início de sintomas (exposição a enchentes, áreas alagadas, lama; esgoto/fossas, lixo/entulho; risco ocupacional como coleta de lixo/ reciclagem, manejo de animais, agricultura em áreas alagadas; e vínculo epidemiológico com um caso confirmado por critério laboratorial ou residir/trabalhar em áreas de risco).

**Critério 2** - Presença de qualquer um dos seguintes sinais ou sintomas; sufusão conjuntival, insuficiência renal aguda, icterícia e ou aumento de bilirrubinas e fenômenos hemorrágicos.

## AVALIAÇÃO CLÍNICA (TRIAGEM)



\* Penicilina cristalina 1.500.000UI, intravenosa, 6/6h ou Ceftriaxona: 1g intravenosa ao dia (se dúvida diagnóstico, fazer 2g/dia). Se contraindicação: Azitromicina: 500mg intravenosa ao dia.

\*\*Obs: Em casos graves coletar amostra de sangue mesmo antes do sétimo (7º) dia de sintomas para solicitar detecção de DNA em PCR, que deve ser enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Em caso de óbito de pacientes com síndrome febril, febril-ictérica ou hemorrágica, recomenda-se coletar imediatamente após o óbito uma amostra de 10ml de sangue, mesmo que já tenham sido feitas coletas anteriores.

