

























Resumo - Nota Técnica N° 18/2024

GEZOO/DIVE/SUV/SES/SC

Para todos tipos de exposição, a primeira medida é lavar o local exaustivamente e abundantemente com água e sabão.

[Clique aqui](#) para acessar a nota.

		CONTATO INDIRETO	LEVE	GRAVE	ADMINISTRAÇÃO/ SORO-IGHAR
ANIMAL	 CÃO OU GATO Passível de observação por 10 dias e sem sinais sugestivos de raiva				-
	 CÃO OU GATO Não passível de observação, ou se no período de observação o animal morrer, desaparecer ou apresentar sinais sugestivos de raiva				-
	 MAMÍFEROS DOMÉSTICOS DE INTERESSE ECONÔMICO Trabalhadores rurais que tiveram contato com animais comprovadamente positivos por exame laboratorial				APENAS NO LOCAL FERIMENTO
	 MAMÍFEROS DOMÉSTICOS DE INTERESSE ECONÔMICO Animais suspeitos sem comprovação laboratorial				-
	 ANIMAIS SILVESTRES				APENAS NO LOCAL FERIMENTO
 MORCEGOS				INTRALESIONAL + IM	

LEGENDA:



Não indicado para profilaxia



Vacina



Soro ou imunoglobulina

CONTATO INDIRETO: Contato em pele sem lesões.

LEVE: Lamber de lesões superficiais ou ferimento superficial em troncos e membros, exceto mãos e pés.

GRAVE: Ferimentos mucosas, cabeça, mãos ou pés; profundo, múltiplos ou extensos em qualquer parte do corpo. Lamber de lesões profundas ou mucosas.

